INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE: CASI CLINICI

Prof. Tommaso Simoncini
Department of Clinical and Experimental
Medicine, University of Pisa

**CORSO INTENSIVO
SU PATOLOGIA UROGENITALE E
INCONTINENZA URINARIA
NELLA DONNA
Lerici - loc. Fiascherino (SP),**

5 Maggio 2017

**Presidenti del Corso
Dr. Ettore Simoncini
Dr.ssa Riccarda Triolo**

CASO 1

S.B., 45 anni, cicli mestruali regolari

Parità 2002, 2 PS (peso massimo neonato 3050 g), episiotomia

Paziente in apparente buona salute, sportiva, nessuna terapia in atto

- Da circa 6 mesi lamenta perdita di urina durante gli sforzi (in palestra, durante la corsa, al colpo di tosse)

CASO 1: ASSESSMENT CLINICO

- 2-3 Pad/Die
- IIQ7: 20
- Genitali esterni e vagina eutrofici, cisto-uretrocele II grado (POP-Q) sotto Valsalva
- Stress test: Positivo (con iper mobilità uretrale)
- PC test: 2/5, simmetrico
- RPM ecografico: assente
- Esame urine: nella norma; urinocoltura: negativa

CASO 1

- Quale scelta terapeutica

**RIABILITAZIONE PELVI-
PERINEALE:
7 SEDUTE**
(Che la paziente esegue con
discontinuità)

CASO 1

Rivalutazione dopo 2-3 mesi

RIVALUTAZIONE

- PC test 3/5
- 2-3 pad/die
- Stress test positivo
- IIQ7: 20

CASO 1

- Quale scelta terapeutica

- Al controllo a 2 mesi: 1 pad/die, IIQ-7: 4 , buona continenza, uretra stabile, stress test negativo, mesh distesa

Caso 2

- G.P. 65 anni
- Parità 0000, menopausa chirurgica a 40 anni (ITA-SOB per fibromatosi uterina) Non eseguita HRT
- Ipertensione in terapia con Ace-inibitore e Diuretico, scarsamente controllata
- Stipsi, non defecazione ostruita

Da circa 1 anno:

- ❖ Urgenza minzionale con episodi di incontinenza
- ❖ Bruciore e secchezza vaginale
- ❖ Storia di UTI ricorrenti

Caso 2: ASSESSMENT CLINICO

- 5-6 Pad/Die, nicturia (3 volte a notte)
- IIQ7: 22
- Marcata vulvovaginite atrofica, non prollasso di volta, cistocele e rettocele di I grado (POP Q), trigono vescicale non dolente, uretra stabile
- Stress test: negativo
- RPM ecografico: assente
- Esame urine: nella norma;urinocultura: negativa;citologia urinaria: negativa

CASO 1

- Quale scelta terapeutica
- Terapia farmacologica
 - Già eseguita terapia con **antimuscarinici** (Solifenacina), abbandonata per ridotta compliance da effetti collaterali (peggioramento stipsi, secchezza fauci)

MIRABEGRON

*Agonista Rec. adrenergici Beta3
(1B)*

CASO 2: scelta terapeutica

❖ Terapia estrogenica locale per via vaginale (Gel, Cp vaginali) per 6 mesi

❖ Terapia con probiotici e lassativi osmotici (per migliorare il transito intestinale)

❖ Ciclo di elettrostimolazione percutanea del Nervo Tibiale Posteriore (12 sedute mono settimanali)

CASO 2

Al termine della terapia la paziente riferisce **parziale beneficio con importante riduzione dell'incontinenza notturna**, meno rilevante il miglioramento dell'incontinenza diurna.

Miglioramento dei sintomi da atrofia vulvo-vaginale e della disuria.

La paziente si ritiene soddisfatta.

**Grazie per
l'attenzione**

**CORSO INTENSIVO
SU PATOLOGIA UROGENITALE E
INCONTINENZA URINARIA
NELLA DONNA
Lerici - loc. Fiascherino (SP),**

5 Maggio 2017

**Presidenti del Corso
Dr. Ettore Simoncini
Dr.ssa Riccarda Triolo**