A.G.E.O.
Corso di Aggiornamento in
GINECOLOGIA e OSTETRICIA
Bologna, 29-30 Settembre 2017

Il partner maschile:
Diagnosi e Terapia della PeIN

Dott. Gaetano Bandieramonte
gaetano.bandieramonte@yahoo.it

Già Dirigente medico, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Diagnosi e Terapia della PeIN

Patol. infettive virali :

HPVi Subclinica e Clinica

Patol. Displastica :

PeIN I,II,III

(sinonimi: PIN, CIS, Tis)

***Aspetti
clinici***

- **DIAGNOSI**
- **TERAPIA**

Patologie della superficie del pene: DIAGNOSI

PENISCOPIA

Anni '80: completa l'esame clinico superf. glande, solco, prepuzio, asta, frenulo, meato uretrale.
Realizzata con ingrandimento 6-12 X (colposcopio o lente) e con acido acetico in soluzione al 5%, per 2 min.

INDICAZIONI

1. Diagnosi precoce e diagnosi differenziale
2. Scelta sede biopsia mirata
3. Aiuto indicazione terapeutica (chirurgia primaria o medica pre-chirurgia)
4. Definiz. intraoperatoria bordi lesione
5. Valutaz. postoperatoria e follow-up

LIMITI: non sempre aiuto decisivo, mancano precisi criteri diagnostici

- difficoltà legata allo spessore epiteliale e poco accurata nell'identificaz. invasività iniziale

Complementari alla peniscopia: **Meatoscopia, Uretroscopia**

CLASSIFICAZIONE PENISCOPICA TRADIZIONALE

Elementi distintivi: Colore, Vascolarizzazione, Superficie
Uno stesso aspetto può rappresentare CIS o ca. (iniz.) invas.

- **Les. Rosse:** Queyrat, Paget genitale (DD: eczema, balaniti acute, psoriasi, altre dermatosi)
- **Les. Bianche:** evoluz. Cherat. dell'epitelio (DD: HPVi clinica, lichen sclerosus, ca. verrucoso)
- **Les. Brune:** M.Bowen, Bowenoid Papul., M.Kaposi (DD: HPVi, lentigo, iperpigm. fisiolog.)

NUOVA CLASSIFICAZIONE: aggiunge "spessore" e distingue les. displastica. e neoplast. iniz.
(Bandieramonte G., DePalo G. et al., Eur. Urol., 2008)

- **Type R:** Red lesion, flat or slightly risen, abnormal vascular patterns & sharp borders
- **Type W:** White-grey lesion, slightly elevated, and sharp borders
- **Type C:** Cupuliform, warty like, plurifocal
- **Type E:** Exophytic plaque, with or without ulceration

BIOPSIA

- Per conferma istologica del sospetto diagnostico;
- Per informazioni sulla patologia (gravità, estensione, possibili terapie) e possibile decorso (prognosi).
- Eseguita con pinza apposita, previa infiltr. di sol. anestetica (lidocaina 2%), o applic. di crema anestetica (Emla).
- Il tessuto prelevato, immerso in formalina, viene inviato in laboratorio per la preparazione e l'analisi.

Patologie infettive virali: HPVi subclinica

Quadri peniscopici di HPVi SUBCLINICA maculare del prepuzio

**HPVi SUBCLINICA
maculare del
meato uretrale**

Patologie infettive virali: HPVi clinica

Quadri peniscopici di HPVi CLINICA (papulare):

Condiloma leucoplasico

**Condiloma gigante,
Buschke-Lowenstein**

**Condiloma del canale
uretrale anteriore**

Patologie infettive virali:

HPVi, Diagnosi Differenziale

Balanite erpetica

Granuli di Fordyce:
ammassi di papule di
materiale sebaceo,
prepuzio ventrale

Papille fisiologiche
corona e frenulo

HPVi corona

Correlazione fra HPV_i, CIS e CA. Invas.

Il DNA dell'HPV è stato identificato nel :

- 70 - 100% dei pazienti portatori di PIN
- 40 - 50% dei pazienti con ca invasivo

HPV 16 (e 18) sono responsabili di :

- 70% dei Ca. della cervice, della vagina e dell'ano.
- 40% dei Ca. della vulva, del pene e dell'orofaringe

NB : La prognosi del Ca. del pene da HPV è meno grave (sopravvivenza a 5 anni: 93% vs 78%, Lont 2006)

Tabella 8.5. – Riassunto degli studi sul ritrovamento del DNA HPV 16 e 18 nelle displasie peniene.

AUTORI	IDENTIFICAZ.	ISTOLOGIA	DNA HPV			N° tot. (%)
			16	18	altri	
Barrasso (1987)	SB	PIN/ <i>in situ</i>	10	0	?	10/13 (77)
Demeter (1993)	SB	PIN/ <i>in situ</i>	12	-	-	12/13 (92)
Masih (1993)	ISH	PIN/ <i>in situ</i>	2	0	1	5/8 (63)
Aynaud (1994)	SB	PIN/ <i>in situ</i>	33*	5*	25	35/59 (60)
Cupp (1995)	PCR	PIN/ <i>in situ</i>	20*	2*	2	21/25 (84)

* = Doppia infezione

SB: Southern Blot; ISH: Ibridazione *in situ*; PCR: Polymerase Chain Reaction.

Patologia displastica: Problema Diagnostico

Terminologia

Cambiata per le conoscenze di eziologia (HPV16) e patologia:

PIN (Penile Intraepithelial Neoplasia, analogia con VIN), sinonimi Pein, CIS, Tis

Comprende: E. Queyrat, M. Bowen, Papulosi Bowenoide

ETEROGENEITA'

- **Varietà morfolog. (polimorfismo):** Papulare, Paracheratotica
- **Varietà cromatiche:** Rossa (55%), bianca (30%), pigment. (15%)
- **Focalità:** Unifocale, multifocale, confluyente
- **Localizzazione:** Glande, solco, prepuzio, multifocale
- **Delimitaz. confini della lesione:** Incostante

- **Differenziaz. tipo di lesione:**
 - PIN 1-2 (basso grado) HPV correlata
 - PIN 3 (alto grado) Variabile età, correlaz. HPVi, ed evoluzione

- **Rischio canceriz. (*precancerosi o precursori del carcinoma*)**
 - **Basso:** Corno cutaneo
 - **Medio:** Balanite xerotica obliterans (lichen sclerosus et atrophicus)
 - **Alto:** PIN-CIS (E. Queyrat, M. Bowen, Papulosi Bowenoide, M. Paget)

- **Istologia:**
 - 40% Assoc. con HPVi (Parkin, 2006) e Ca Invas.
 - 20% discord. tra esame bioptico e definitivo
 - Non univoca identificaz. dell'invasività iniziale

Patologia displastica: PIN1-2-3

PIN 1

**PIN2, peniscopic Type R,
pre ac acetico**

**PIN2, peniscopic Type R
post ac. acetico, aspetto
sinusoidale dei vasi**

PIN3, Type R

PIN 3, Type R

PIN 3, Type R

Patologia displastica: PIN3

PIN3, Peniscopic Type W

PIN 3, pre e post ac. acetico 5%

CIS: M. di Paget

PIN 3, bruna

DD: M. Di Kaposi

DD: Lentigo peniena

INDICAZIONI TERAPEUTICHE GENERALI

Obiettivi: Diagnosi, Controllo lesione, Risoluz. sintomi, Preserv. qualità di vita
•Scelta metodiche disponibili: distruttive (senza istologia dell'intera lesione, non consentono giudizio sicuro su completezza del trattamento) ed escissionali.

HPVi: Ter. farmacol. topica: Imiquimod (aldara), 5-FU,
Chir. distruttiva: Laser CO2 (vaporiz.), DTC, crio (obsoleti)
Chir. Esciss. laser CO2 in peniscopia (Leep se lesioni limitate)
Ter. Combinata
A. fisica + farm. sequenz. : casi poco responsivi (persist. in sede tratt.)
B. fisica + farm. adiuvante : consolidamento, prevenz. recidive
C. farm. neoadiuvante + fisica riduttiva : per lesioni molto estese

PIN-CIS, TIS *Chir. Esciss. laser CO2 in peniscopia* (Linee Guida Ital. ed Eur.)

“La chirurgia Laser CO 2 o Nd: Yag è superiore alla chir. di Mohs, alla ter. Fotodinamica, e alle terapie topiche (imiquimod, 5Fu)”

Ca. T1 N0 G1, prepuzio: escissione radicale (circoncisione)

Ca. T1 N0, iniz. invas glande e solco, senza estens. spazi linf., profondità invas. < 1.0 mm, indipendentem. dal diametro :

Chir. Esciss. laser CO2 in peniscopia

Terapia *farmacologica topica*: HPVi e CIS

Imiquimod

Immunomodulatore, a scopo terapeutico riduttivo o complementare, in forma di crema al 5%. In campo maschile, è stato somministrato alla dose di 3 applicazioni alla settimana per la condilomatosi estesa del pene (Cortes, 2007), e per la neoplasia intraepiteliale (Kaspari, 2002; Dirschka, 2006; Taliaferro, 2008).

Con la somministrazione giornaliera per lesioni multifocali sono segnalate reazioni cutanee quali erosioni, edema, bruciore e prurito del glande.

5-FU (Fluorouracile)

Chemioterapico antitumorale, classe antimetaboliti. Inizialmente usato negli anni '60 alla concentrazione del 20% nel trattamento del VAIN, fu abbandonato a causa della severa tossicità; poi reintrodotta sotto forma di unguento al 5%, per il trattamento della infezione da HPV e del CIS.

Per l'effetto citotossico selettivo limitato all'epitelio patologico, il 5-FU è indicato per lesioni superficiali genitali maschili e femminili.

E' dotato di lieve tossicità locale (eritema, edema, bruciore, dolore, disuria) ma non tossicità sistemica dato che l'assorbimento è trascurabile (6%).

Chirurgia Laser CO2, generalità

CO₂ Laser

- Scarsa penetraz. nei tessuti per elevato assorb. da parte H₂O
- Preciso controllo chirurgico per fini incisioni

- Association with operating microscope for**
- Lesion borders identif.
 - Stability & micromanip.
 - Surgical plane selection

Rules of application:

- **Anaesthesia** Topical + sublesional
- **Instruments** CO₂ Laser + operat. microscope
- **Accessories** Micromanipulator, retractor
- **Safety measur.** suction device, eye protection
- **Field magnific.** 6 - 12 x
- **Focal distance** 250-300 mm
- **Spot $\emptyset$** 0.5 - 2 mm
- **Power out-put** 10 - 25 W
- **Beam emission** CW and pulsed (0,05 sec)
- **Surface excis.** Partial or Total (Glans, sulcus, meat. & uret.canal involv.<0.5 cm)
- **Depth excis.** 1-2.5 mm (spongy layer)

Advantages of excision vs destruction:

- Operatory specimen for pathologic exam.
- Constant plane of tissue removal
- Lymphatic and vessel sealing in healthy tissue
- Avoiding smoke problems of cancer tissue evaporation

Tumor invasion

Healthy resect. borders

Indicazioni generali all'impiego della Microchirurgia Laser CO2

Procedure

-Destructive

-Excisional*

-Coagulative

Types of lesion

-HPVi, subclinical, clinical

-HPVi, Clinical
-Leucoplasia, PIN-CIS-Tis
-Doubtful pigmented lesion
-Early invas. SCC (init. & superf)

-Frenulum brevis
-Phymosis
-Liches sclerosus (BXO)
-Kaposi sa.

-Angioma/Lymphangioma

Cure postoperatorie (x 20-30 gg)

-lavaggi con antisettici (Betadine)
-gel anestetico (Luan)
-garze grasse
-analgesici e antiflogistici per os
-astensione dai rapporti sessuali
-guarigione per 2a intenzione
-primo ctr 1 mese dall'intervento

* Excision under peniscopic control

Surface Partial: for small lesion of

Glans, Sulcus, Meatus & distal Urethr. Canal

(when urethral canal is involved > 0.5 cm, resection followed by urethroscopy and ND:Yag laser treatment may be indicated)

Surface Total: for plurifocal or confluent dysplastic areas

or Primary cancer involving more than half the circumference of the organ

Depth (1-2,5 mm, lamina propria, up to the spongy layer)

Tegumenti Glande : cute/mucosa /Corion /lamina propria (albuginea sottile, raggiata) / Corpo spongioso (Manca dartos e fascia di Buck)

Microchirurgia Laser CO2 (sotto controllo peniscopico) DISTRUTTIVA per HPV_i subclinica

**Subclinical macular HPV_i
of the prepuce**

**After Laser abrasion
at minimal depth**

**Subclinical
micropapular HPV_i of
the prepuce**

**After Focal
Laser vaporization**

Microchirurgia Laser CO2 (sotto controllo peniscopico) ESCISSIONALE per HPVi clinica

**Clinical HPVi of the
Sulcus and preputial area**

After Laser excision

**Clinical HPVi of the
distal urethral canal**

After Laser excision

**HPVi clinica, glande e
canale uretrale distale:
indicazione
all'escissione con CO2
laser, seguito da
uretroscopia e ND:Yag
laser in fibra ottica**

Microchirurgia Laser CO2 (sotto controllo peniscopico) ESCISSIONALE per PIN - CIS

PIN3 of glans & sulcus, partial surface excision

CIS of the glans dorsal area with Hypercheratosis (Type W) Partial (subtotal) surface excision

Microchirurgia Laser CO2 (sotto controllo peniscopico) ESCISSIONALE per **Ca. Iniz Invas.**

Total surface excis., Init. Invas. SCC (Type R) of glans & sulcus

Total surface excis., Init. Invas. SCC (Type W) of glans & sulcus

Peniscopically controlled laser excision (PCLE) for Conservative Treatment of *in situ* and T1 penile Carcinoma. Results of 193 pts. (INT-MI, 1981-2002)

EUROPEAN UROLOGY 54 (2008) 875-884

Istol.group	N. pts	Follow-up Median (Range)	NED	Recurrences		% rec.	Amput. (uret.ext)
				As PIN,	as inv.SCC		
CIS	92	57 (12-212)	81	10	1	12	1
Init. Inv. SCC	67	67 (12-214)	57	6	4	15	3
Superf. SCC (VBM)	34	100 (12-234)	27	-	7	21	3
Total	193	60 (12-234)	165	28*		15	7 (4 %)

- Resez. tot. superf. glande: 98 (47 circoncis. assoc. per estens. prepuz.)
- Resez. parz. superf. glande: 95 (32 circoncis. assoc. per estens. prepuz.)
- Procedure in Day Hosp.: 98%
- Riepiteliz. per seconda intenzione: media 6 sett., senza retrazioni cicatriz.
- Emorragia, dolore, infezioni postoperatorie trascurabili
- Attività sessuale non condizionata dall'intervento
- Follow-Up bimestr. 1° anno, in seguito tre volte l'anno
- *21 recid. locali ritrattate con Laser, 7 amput. per estens. uretr., 4 LAD (N+)

available at www.sciencedirect.com
journal homepage: www.europeanurology.com

European Association of Urology

Penile Cancer

Peniscopically Controlled CO₂ Laser Excision for Conservative Treatment of In Situ and T1 Penile Carcinoma: Report on 224 Patients

**Gaetano Bandieramonte^a, Maurizio Colecchia^b, Luigi Mariani^{c,*},
Salvatore Lo Vullo^c, Giorgio Pizzocaro^d, Luigi Piva^d, Nicola Nicolai^d,
Roberto Salvioni^d, Valentina Lezzi^e, Bernardina Stefanon^e, Giuseppe De Palo^e**

^aDepartment of Surgery, Day Surgery Unit, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

^bDepartment of Pathology and Cytopathology, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

^cUnit of Medical Statistics and Biometry, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

^dDepartment of Surgery, Unit of Urology, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

^eDepartment of Preventive and Predictive Medicine, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milan, Italy

Microchirurgia Laser CO2 (sotto controllo peniscopico) ESCISSIONALE per **Lesioni Pigmentate**

Peniscopically controlled laser excision (PCLE) for Nevoid lentigo (melanosis) of the sulcus

PCLE for *In situ* melanoma of the glans, 53 y pt

PCLE for Invas. melanoma of the glans, sulcus and prepuce, 45 y pt

Conclusioni

HPVi, CIS e carcinoma “early” del pene rappresentano un’area problematica per il dermatologo, l’urologo, l’oncologo, e il ginecologo che esegue il controllo partner.

I SUCCESSI dipendono da:

**conoscenze del clinico,
scelta del trattamento adatto alla situazione particolare,
selettività del piano di rimozione della lesione**

La CHIRURGIA LASER presenta SVANTAGGI quali:

**Costo strumentazione e microscopio operatorio
Curva apprendimento tecnica, manutenzione e misure di sicurezza
I relativi VANTAGGI sono rappresentati da:
Escissione sotto guida microscopica, selezione del piano chirurgico
Controllo emostasi, migliore visualiz. confini tessuto sano-patologico
Ridotti costi di degenza, Decorso post-operatorio autogestito
Trattam. conservativo efficace per lesioni pre-neopl.e neopl. iniz.
Risultati anatomici, cosmetici e funzionali ottimali**

Gli INSUCCESSI dipendono da:

**la mancata completezza in sede d’intervento,
persistenza in sede adiacente di malattia in forma latente,
reinfezione (dal partner), depressione immunitaria**

Le difficoltà in diagnosi e trattamento (ter. medica impropria, under & over-treatment), e personalizzazione nella gestione ne consigliano il riferimento a strutture con specifica esperienza.

Diagnosi e Terapia della PeIN

grazie

Dott. Gaetano Bandieramonte
gaetano.bandieramonte@yahoo.it
Cell 335 477 472